

Virus

CHIKUNGUNYA

Chikungunya es una enfermedad producida por el virus chikungunya, el cual es transmitido a los seres humanos mediante la picadura de los mosquitos hembra infectados del género *Aedes*, el mismo vector de enfermedades como dengue y Zika.

La distribución del vector de transmisión en zonas tropicales y subtropicales del planeta determina la distribución de la enfermedad, la cual **se ha reportado en más de 110 países de África, Asia, Europa y América.**

Mediante una **muestra de sangre** se puede detectar la infección mediante la técnica molecular reacción en cadena de la polimerasa (PCR) durante la primera semana desde el inicio de los síntomas.



“**En el año 2022**”

251.216 casos de chikungunya en América, siendo Brasil el país con más casos reportados durante este año.

Síntomas

Inician generalmente entre 3 a 7 días después de la infección.

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular y articular
- Náuseas
- Inflamación en las articulaciones
- Erupción cutánea
- Cansancio

Generalmente, la mayoría de personas infectadas se recuperan completamente, sin embargo, **pueden presentarse complicaciones cardíacas, oculares y neurológicas derivadas de la infección con el virus.**

Las personas mayores, bebés y niños pequeños tienen mayor riesgo de presentar un cuadro clínico grave con complicaciones, la fiebre causada por la infección viral puede aumentar el riesgo de muerte.

No existe un tratamiento

específico para esta enfermedad. Sin embargo, el manejo que se le da al chikungunya **se enfoca principalmente, en tratar la fiebre y los dolores en las articulaciones con analgésicos**, guardando reposo y administrando líquidos a la persona infectada.

Prevención

Se basa principalmente en **prevenir las picaduras de *Aedes*** para evitar la infección, por esta razón.

Recomendaciones !!



Uso de repelente



Uso de ropa cubierta



Las siestas durante el día realizarlas bajo toldillo.



Limpieza semanal de los sitios de los depósitos de agua estancada cerca de las casas.

Las personas infectadas

con el virus deben permanecer bajo un toldillo para evitar la picadura y posible infección de los mosquitos.